





Hipertiroidismo Felino

Terapia con *vidalta*®

Fase de Inicio:

T4 total	Dosis de Vidalta	
4 - 8 $\mu\text{g/dl}$ 50 - 100 nmol/l	 10 mg	Una vez al día
> 8 $\mu\text{g/dl}$ 100 nmol/l	 15 mg	Una vez al día

Ajuste de la dosis:

T4 total después de 10-14 días y dependiendo de la respuesta, puede ser necesario repetir 3, 5 y 8 semanas después.

< 0,8 $\mu\text{g/dl}$	Reducir la dosis de Vidalta. ¹
0,8 - 4 $\mu\text{g/dl}$	Rango normal.
4 - 8 $\mu\text{g/dl}$	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de disminución (bajada) fuerte medir en 10 días la T4 total. • En caso de disminución (bajada) leve aumentar la dosis de Vidalta.²
> 8 $\mu\text{g/dl}$	Aumentar la dosis de Vidalta. ²

1. Para los gatos con menos de 10 mg de carbimazol/día la administración de Vidalta en días alternos puede controlar la enfermedad.
2. Las dosis mayores de 20 mg de carbimazol/día deben administrarse con precaución.

Fase de mantenimiento:

Seguimiento cada 3 a 6 meses.



UNI
ENDO
EXPERTOS EN
ENDOCRINOLOGÍA
MSD Animal Health

MSD
Animal Health